



**ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO
VARAŽDINSKE ŽUPANIJE**

Ivana Meštrovića 1/11
42000 Varaždin
OIB: 20184981156

Broj: 03/1365-2023

Varaždin, 12. prosinca 2023.

**UPRAVNI ODJEL ZA PROSVJETU, KULTURU
I SPORT VARAŽDINSKE ŽUPANIJE**
n/r Dr. sc. Miroslav Huđek
n/p svim ravnateljima obrazovnih ustanova

**Predmet: obavijest o postupanju u osnovnim i srednjim školama Varaždinske županije
u slučaju hripavca**

U Varaždinskoj županiji prisutno je obolijevanje od hripavca, osobito u djece školske dobi. Stoga Vam se obraćamo s osnovnim činjenicama o bolesti i postupanjima prema preporukama Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo.

Osnovne informacije o hripavcu

Hripavac ili pertussis je akutna, visoko zarazna bakterijska infekcija dišnog sustava, karakterizirana napadajima spazmatičnog kašlja.

Uglavnom se javlja u dojenčadi i male djece.

Tijek bolesti je postupan. Bolest počinje nespecifičnim kataralnim simptomima (poput prehlade), zbog čega se u početku, kada je osoba najzaraznija, ni ne posumnja na hripavac, pa bolesnik neometano širi bolest. Prosječna inkubacija je 9-10 dana (s rasponom od 6 do 20 dana). Rezervoar bolesti je čovjek.

Od hripavca obično obolijevaju necijepljena ili nepotpuno cijepljena djeca, ali i starije osobe jer imunitet stečen cijepljenjem ili preboljenjem s vremenom slabi. U situacijama pada kolektivnog imuniteta, mogu oboljeti i starija djeca i mlađi odrasli.

Bolest se manifestira kroz tri stadija.

U prvom javlja se curenje nosa ili začepljen nos i kašalj (kod dojenčadi slabo prisutan). Temperatura može biti blago povišena (do 38 °C). Ovaj stadij obično traje 1-2 tjedna.

U drugom stadiju javljaju se napadaji kašlja u trajanju od 2 do 6 tjedana. Kašalj je specifičnog prizvuka s hripanjem, a često se javlja u napadima, osobito noću. Intenzivni napadaj kašlja može izazvati povraćanje. Treći stadij je faza oporavka koji također može trajati nekoliko tjedana.



ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO VARAŽDINSKE ŽUPANIJE

Ivana Meštrovića 1/11
42000 Varaždin
OIB: 20184981156

Moguć je razvoj komplikacija bolesti, što ovisi o dobi, o cijepnom statusu oboljelog, o brzini provedbe dijagnostike i terapiji. Bronhopneumonija je najčešća komplikacija.

Bolest je najopasnija za necijepljenu djecu do 12 mjeseci starosti, ali i za svu drugu necijepljenu ili nepotpuno cijepljenu djecu.

Liječenje:

Oboljele osobe se liječe specifično antibioticima prema smjernicama za liječenje hripavca. Za vrijeme trajanja terapije osoba ostaje kod kuće i ne dolazi u kolektiv. Pritom također treba izbjegavati kontakt s malom djecom, dojenčadi (posebice necijepljenom) i trudnicama u zadnjem mjesecu trudnoće.

Postupak kod pojave oboljelog u razredu potrebno je:

Postupanje za u slučaju pojave hripavca određeno je preporukama Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo, a najviše se odnosi na zaštitu vulnerabilnih skupina: male necijepljene djece u dobi do 12 mjeseci, trudnica i imunokompromitiranih bolesnika, koje žive u kućanstvima bliskih kontakata oboljelog od hripavca. Zbog toga je indicirana primjena kemoprofilakse (specifičnim lijekovima) koju propisuje izabrani liječnik.

Isto tako, potrebno je simptomatsko dijete s kašljem uputiti izabranom liječniku radi potrebe dijagnostike, te eventualne terapije ako se radi o hripavcu.

Procijepljenost djece u razredu će se provjeriti s liječnicima školske medicine i nepotpuno cijepljena djeca će biti pozvana na cijepljenje.

Ako se dogodi grupiranje obolijevanja u razredu, postupa se također prema preporukama HZJZ, o čemu će razrednike i ravnatelje obavijestiti epidemiolozi i liječnici školske medicine.

Stoga molimo ravnatelje i razrednike da svakom djetetu daju obavijest za roditelje koju je pripremila Epidemiološka djelatnost Zavoda za javno zdravstvo Varaždinske županije da se jave izabranim liječnicima samo ako zadovoljavaju neki od navedenih kriterija za terapiju ili obradu.

Prilog: Obavijest za roditelje

Ravnatelj:
Marin Bosilj, dipl. san. ing.

uz dr CM